

**DISSERTAZIONE
CHIRURGICA SOPRA
DI UNA FISTOLA
APERTA RASENTE
L'ORLO DELL'ANO, ...**

Francesco Barsanti

DISSERTAZIONE CHIRURGICA

*Sopra di una Fistola aperta vicino l'orlo dell'Ano,
con effo e la Nutrice sinistra, e che si estendeva per
la lunghezza di un pollice più di quattro dita sopra
l'Inguine verso dietro al Muscolo Cefalotroco, senza
che l'Inguine fosse aperto, onde la Fistola era della
specie di quelle che dicono circo, e della Cura ra-
dicalissima praticata in essa.*

O P E R A
DI FRANCESCO BARSANTI
PROFESSORE DI CHIRURGIA

E ACCADEMICO
DELLA REALE SOCIETÀ DI BOTANICA,
E SCIENZA NATURALE IN CORTONA.

LIVORNO 1777.

Per GIO VINCENZO FALORNI.

Con Approvazione.

*Alnus quoque multa, tandem plena mala recipit,
atq; a se malum abhorrens curatior habet.*
Gall. Lib. 4. Cap. 18.

*Quid improbe, quae bene sunt columen tectus, ut
multitudo placeat, cum licet tibi veritate con-
templatione evellere se diligens offit, & veritatem
amovet?*

Gall. Med. Lib. 1. Cap. 1.



DISSERTAZIONE



L' Ano è soggetto a molti mali, tra i quali, e forse i più frequentati di tutti gli altri, annoveransi anche gl' Afcelli.

Gl' Afcelli dunque che nascono attorno l' Ano per la separazione di qualche furoccolo, o tubercolo infiammatorio, sono tumori composti di marcia, e questa nasce da infiammazione, e separazione della sostanza cellulare che per ogni parte l' Ano circonda, e per la superficie esterna dell' Intestino retto s' estende: Ma qualunque sia la cagione dell' accennata infiammazione, e separazione, bisogna aprir l' ascesso. La semplice apertura dell' ascesso, a mio credere, non apporta alcun vantaggio al malato; imperocchè se l' ammarcamento è stato profondo, cioè in quella giuglandina che avvolge la parte più carota dell' Intestino retto vi è il pericolo che il male si giri ad una Fistola: Onde per impedire che il malato non rimanga fistoloso, conviene aprire tutt' i vasi che si manifestano dopo l' apertura dell' ascesso, e in-
cludere bisogna con un taglio aprir l' Ano; e se

4
quello non s' apre il male di gola inevitabilmente ad una Fistola.

Da questa breve descrizione si rileva, che gli ascessi non per la suppurazione della pieguelina che circonda l'estremità dell'Incessino vero, come fanno mal curati cagionano in fine la Fistola all'Ano, la quale però non merita d'esser confusa coll'ascesso, poichè questo è un tumore ripieno di marcia che merita di essere aperto per cavar la medesima; e la Fistola è un'ulcera alta, angusta, e cellosa che deve convertirsi in piaga aperta per consumar la carne carnea, e la callosità che la circonda, per ottenerne il totale abolimento.

Io ho discusso degli ascessi cari per la suppurazione di quella pieguelina che circonda l'Ano, non già che sia mio scopo di trattarne, ma per far vedere che la Fistola dell'Ano è la configurazione dell'apertura de' medesimi, della quale procederò a trattare.

Per Fistola perfetta, completa, o penetrante, s'intende quell'ulcera ch'è aperta negl'integumenti, e comunica colla cavità dell'Incessino; Imperfetta, incompleta, o esterna chiamasi quella ch'è aperta solo negl'integumenti, ed effusa sopra l'Incessino, senza che questo sia perforato.

Dunque quando da un ascesso attorno l'Ano sia nata propriamente una Fistola profonda, stretta, senza dolo, o con callo, varie maniere sono state proposte per condurla alla perfetta guarigione, e sono i Cauterj, la Legatura, ed il Taglio. Il Cauterio una proposta da alcuni in quelle Fi-

5
 fole poco profonde, e specialmente fra proposti
 i Trocisci di Minio; con questi molte volte si ot-
 tene l'abolimento totale delle medefine; allora
 quando però sono, come si disse, poco profonde,
 e cutanee, ma la dilatazione col taglio si deve
 sempre preferir ai Caustici; nelle Fissole che pe-
 netrano molto in alto l'uso de' Cluschi non giova
 molto, perchè l'achse de' medefini non si può
 così bene dirigere, onde ella è ancora la dilata-
 zione. La Legatura è stata proposta, e commendata da
 Celfo Lib. VII. Cap. IV., il medesimo c' insegna
 di farla con un refe più o meno grosso, secon-
 do la larghezza della Fissola, il quale si passa
 come un laccio, e si stringa pochissimo, facen-
 done un nodo assai largo co' due estremi, ed ogni
 giorno si faccia sciorire per rinuovare la parte
 infestata, dic' egli, che se sarà corrotta la cute,
 la quale è sopra la Fissola, ma ci avverte, che la
 cura sarà lunga, quantunque senza dolore, chi vo-
 le abbreviare la cura (ci avverte in oltre) deve
 stringere la pelle col refe, acciò più presto tagli,
 e recidi, e la notte porvi dentro alcune cose li-
 quide, perchè si allonghi la cura da quella stessa
 cosa, dalla quale viene fatta; queste cose però ca-
 gionano dolore, si accresce alorai l'infiamma, e
 tormento insieme, se il refe, e ciò che vi si è po-
 sto dentro s'impastura con qualche medicamento
 corrosivo.

Il Sig. Foubert, nel III. Tomo della Reale
 Accademia di Chirurgia pag. 473. sembra abbia
 voluto rinovare una tal pratica, mentre egli pro-
 pone d'introdurre una vergheua di piombo, i due

esterni della quale si ammorsino la giù, e sotto la Fistola, e ogni giorno più si stringono, fino che sia recisa la cute, ma però si deve sempre preferir il Taglio, mentre è più spicciativa, e in un subito può far ciò, che colla legatura non si può ottenere, come il consiglia lo stesso Feubert.

Del mezzo della Legatura ce ne possiamo servire in occasione che il malato abbia avuto al taglio, e che la Fistola sia ristretta in un punto dell' Ano, non molto lunga, superficiale, e senza collo; ma non si può più nemmeno dubitare, che la maniera più breve, e sicura di curar le Fistole dell' Ano non sia il Taglio; gli antichi Curafici lo facevano con una semplice Testa quadrata, e con lo Scalpello, così da loro chiamato, e dipoi inventarono quello strumento detto la Falcetta, della quale usavagliono i Curafici se ne servono.

L'arte pertanto ci somministra i mezzi seguenti, per la cura radicale della Fistola dell' Ano, ch'è di convertirla in piaga aperta, o in perfena, completa, o penetrata; imperfetta, incompleta, o esterna.

Se la Fistola è della specie di quelle che discorri imperfetta, o cieca, cioè che non penetrano nella cavità dell'Intestino, si fa mettere il malato in quella situazione che riesce più comoda al Curafico che deve operare; quindi s'introduce nella Fistola una Testa d'argento flessibile con la punta acuta, e pungente; s'introduce permen- te il dito indice della mano sinistra nell' Ano in per l'Intestino, in modo che la punta del medesimo dito

arrivi a toccare il fondo della Fistola contro la punta della Tetta già introdotta, ed esse manovra si spinge in avanti si dana con esso dito dritto, e fermo quanto si può l'intestino, tanto che quello si perfori da una parte all'altra, dirigendo la punta contro il dito, e quando questa si senta vada nella cavità dell'intestino si spinge un poco innà, e col medesimo dito si ne abbassa, e piaga la punta in giù a poco a poco, affinché non vada a piagare la parte opposta dell'intestino, e a poco a poco, diti, sempre più piegandola, e tirandola in giù in modo che faccia un volo, allorché le due estremità della Tetta sono fuori dell'Ano. Nell' istessa maniera si deve condurre, piagare, e tirar fuori la Tetta flessibile se la Fistola fosse anche completa, o aperta nella cavità dell'intestino.

Introdotta, e spiegata la Tetta flessibile, il Ceratiko con la mano sinistra ne stringe le due estremità che sono fuori dell'Ano, la tira in giù, ed la faesi quanto più può all'esterno, e con un Diamante, o Bisturio, taglia perpendicolarmente tutta l'abertura della carne, che rimane compresa nel volo della Tetta flessibile. Quando la Fistola fosse di qua della fine del muscolo Costrittore dell'Ano, ci possiamo servire anche di una Tetta fatta d'argento, canalata, e alquanto curva dalla parte della sua faccendatura: questa s'introduce nella Fistola, e mentre se ne fa l'introduzione si volge il manico della medesima contro la Natica, e la punta si dirige obliquamente verso la cavità dell'intestino, poi passando col dito nell'Ano dietro della Tetta, questa si tira fuori del mede-

fino, supposto che la Fissola penetri nella cavità dell'Intestino, senza piggiarla, facchè ella venga ad appoggiarsi contro il margine della Natica opposta, ed essendo la Fissola, come si disse, poco profonda, si può tagliare la carne, che rimane sopra la Tetta per lunghezza, faccandone scorrere il Canacere lungo la scala interna della Tetta con la parte tagliente volta all'Intò, la qual dilatazione siol servire per ottenere la perfetta guarigione.

Se la Fissola dell'Aso, come abbiamo detto, non s'intermano molto, si possono aprire anche con quello strumento detto la Falcetta, la Tetta della quale s'introduce lungo la Fissola, come si è detto dell'altra, si spinge innò, e si piega, facchè tutta la Tetta scori dall'Aso, la Falcetta nel tempo stesso penetra nella Fissola per tutta la di lei lunghezza, quindi s'appoggia il suo Tagliente contro la volta della Fissola, si tira, togli con una mano la Tetta, e coll'altra si spinge innò la Falcetta, e così si viene a tagliare per tutta la lunghezza la volta dell'accecata Fissola: Se vi sono altri fistoli, questi parimente devono convertire in piaghe aperte, come potrà esser più comodo, e sicuro. Ma quando la Fissola dell'Aso sono poco alte, e profonde, e che coll'uno, e coll'altro de' descritti mezzi non si possono convertire in piaghe aperte, ci serviranno di questo mezzo, cioè s'introduce la Tetta canalata nella Fissola, e mentre si fa scorrere per la sua lunghezza si ne dirige la punta verso l'Intestino, s'introduce parimente nell'Aso sì per l'Intestino una Cucchiara fatta a guisa di guida per non offendere la parte

opposta del medesimo, una volta che la punta del Bisturio, o del Gansuano sieno scorrente per la scannatura della Terna sia pervenuta nella cavità del naso, ceda allora con lo stesso Gansuano, o Bisturio si taglia l'Aro, e tutto quello che rimane di qua della Terna.

Finalmente s'operi con l'uno, o con l'altro de' menzi accennati, bisogna procurare di rendere la piaga aperta tutta la lunghezza della Fissola, e secondo la sua diversa direzione, diverso ancora deve essere il modo di operare.

Resta di più da questo discorso fare, che in alcuni casi, secondo la profondità del vero fistolo, si recide una maggiore, o minore quantità del muscolo Contrattore dell'Aro, e fino due terzi di esso sieno alcuna volta stati tagliati, come io gli recitai ultimamente in un Giovinetto chiamato Michel Angelo Calosi di Livorno, al quale tagliai una Fissola dell'Aro che si estendeva per la lunghezza di due dita in circa traverso sopra l'Intestino, senza che sia seguita l'insensibilità delle fibre Intestinali, né perdita di sangue, ed egli è guarito in meno di un mese; onde due terzi dell'asservato muscolo Contrattore si possono tagliare impunemente, basta che del medesimo muscolo ve ne rimanga una porzione, perchè possa tornare ad esercitare la sua forza per lo stringimento dell'Aro, e per chiudere, secondo il bisogno le fibre Intestinali: intorno a ciò leggesi Ippocrate nel Lib. dell'Encoiridi, ove dice, „Sphincter tunc rursus potest insidi, quovis modo, sine le-
-a sione sui officii, si saltem ostia ejus pariter re-

„haqueret incerta, alia sequeretur involuntaria
 „secum exitio, & tandem ipsa mori... Ma
 non bado fin qui, perchè se la Fistola dell' Ano
 principia entro l'arco del medesimo, e si esten-
 de per la lunghezza di quattro o cinque dita tra-
 versò sopra l'Intestino retto, o sia prostrato, o
 nè nella curvità del medesimo, tagliando a quell'
 altezza l'Intestino nell'apertura del voto fistolo-
 so, si recide indubbiamente tutto l'alimento, e
 groffezza delle Sineri, ovvero muscolo Costituo-
 tore dell'Ano, che non è maraviglia se succede
 l'elisione involontaria delle fecie, perdita di
 sangue, e finalmente la morte.

Giuseppe Schiaffai di Livorno aveva una Fi-
 stola all'Ano che si estendeva per la lunghezza di
 quattro dita e mezzo sopra il retto, senza che que-
 sto fosse aperto, onde la Fistola era di quelle che
 chiamasi cieche; nell'aprire con un taglio la Fi-
 stola recisi l'Intestino a quell'altezza il dì 16. Apri-
 le 1769. Nel giorno dell'operazione sopravvenne
 al malato la febbre, e conseguentemente a questa
 un' emorragia, quindi mi convenne fare una più
 forte compressione di filo, putrocaccioli, e latta-
 cina compressiva, colla quale per allora mi riuscì
 fermarla per la seconda volta, ma lo seguito ston-
 nò più volte, e finalmente cedè, e sarebbe cessata
 molto prima, se l'elisione involontaria delle
 fecie non mi avesse obbligato a medicare spesso
 la piaga. La febbre si fece acuta, e il malato morì.
 Se quell'Uomo guariva non avrebbe forse po-
 tuto ritenere le fecie per esser rimasto reciso a
 tutta sostanza il muscolo Costituore nell'apertura

di quel gran sito . Lasciade in questi casi è meglio che i malati rimanghino con una Fistola all' Ano, che sarà sempre un male minore, rispetto all' involontaria eiezione delle fecce intestinali, che per se stessa è un grande incomodo per i malati, prima che recider l' Intestino a quella profondità. Da questa osservazione si rileva che quando le Fistole dell' Ano penetrano molto internamente, non conviene farsi l' operazione, e tagliare a quella dimensione l' Intestino, la quale benchè s'usa bene, e secondo le buone regole della Chirurgia, può non ostante avere un esito infelice, rispetto all' emorragia, che può accadere, come più volte è accaduta: Sopra ciò vedasi il Morgagni Lib. III. De Morbis Ventr. Epistola Anat. Medica XXXII.
 „ De Alvi adstrictione, & de haemorrhoidibus „
 „ ore alla fine dell' Art. 8. così si spiega „ tamen
 „ quo magis a splendore alius recedat, eo pe-
 „ riculosisus incilio accidit, sive crassius aliquo
 „ sanguifero vase laeso, sanguinis effluxum con-
 „ cre non possit, sive nervum punget, unde le-
 „ thalis in dolor „.

Il Sig. Foubert nel III. Tomo della Rasse Accademica di Chirurgia pag. 473. riporta otto esempj di voti fistolosi nati da gravi Alceiti intorno l' Ano, i quali dopo averli convertiti in piaghe aperte per una direzione la più comoda, senza però recider l' Intestino deviato, e scoperto all' attenzione di quattro, o cinque dita, ma non perforato, e abolirono stabilmente per un corso di suppurazione di quella purguedine circolante attorno l' Ano, e circondando l' Intestino, il quale seguita a dar.

le si taglia a quell'altre, l'operazione riesce molto grave, e finisce per la di sopra rammentate conseguenze. Laonde io però non credo che vi sarà mai nessun Chirurgo prudente, che s'impegni a fare il taglio all'Intestino nell'apertura di qualche Fistola dell'Ano, quando questa s'estenda sopra il medesimo Intestino assai profondamente, e in alto, allorché quando si può operare diversamente per lasciarlo illeso, supposto che non sia perforato, che in tal caso il male si deve medicare palliativamente.



PIAGA SINUOSA NELL' ANO DI QUESTA NATURA.

APERTURA DEL SINO

Sempre regio all' Inguine cura.

Abolimento del medesimo.

IL malato che fa il soggetto della Storia di questo caso, è un Uomo all' età di 40. anni in circa. Quello tempo che si attentò d' un Tubercolo infiammatorio fra l' Ano, e la parte interna della Natica sinistra. Questo tumoretto s'apparè, e spontaneamente s' aprì. Dall' apertura seguì naturalmente del medesimo nacque un seno fistoloso. Il malato credendo che fosse un male da non farsi caso, andò avanti medicandosi ora con una cosa, ed ora coll' altra, e se bene non le dette alcuno incomodo, rispetto al dolore, e alle materie, volle non ostare che le facesse una via. Le visitai, e trovai che aveva un Sino fistoloso aperto presso l' orlo dell' Ano tra esso, e la Natica sinistra. V' introdussi lo Specchio, e con questo andai esaminando, per sapere dov' ei finiva, e trovai che di qui un voto s' estendeva per la lunghezza

di un poco più di quattro dita avvertì sopra l'Intestino tutto dietro al medesimo Costituito, senza che il medesimo Intestino fosse aperto, e però la Fistola era di quelle che chiamarsi cieche, e un altro voto fistoloso alla distanza di tre dita dall'Ano andava verso il Perineo. La molta profondità di quel suo fistoloso, che dall'Ano si stendeva sopra l'Intestino alla suddetta distanza, lo fece notare, e riscontrare con molta attenzione al Chirurgo ordinario della Casa, che prima di me aveva veduto, e curato il malato, e a tutti quelli che furono presenti, che appieno ne sono informati, e però non la possono negare. Onde vedendo che non si poteva fare un taglio all'Intestino a quella distanza per il pericolo grande che vi era, che tagliandolo a quell'altezza nell'apertura di quel gran voto fistoloso non si spaccasse l'arteria, ne involontaria delle fecce intestinali per la rotta, fosse del muscolo Sphincter, e qualche perdita di sangue capace di dare dello spavento, e di produrre anche la morte, come successe nel suddetto Giuseppe Schiattini, e come se lo attesta l'opinione del lungo citato, ed riferita nel Cap. XVI. §. V. della sua Chirurgia P. II. Sect. V, e però introdotta la Testa carolata fino al fondo della Fistola, col Garzante fatto scorrere per la sua incisione, li aprì con un taglio assai profondo, quasi tra l'Ano, e la tuberosità dell'Ichio, come dice il Sig. Foubert nel lungo citato, lasciando però illeso l'Intestino, e per la parte del Perineo tralì il taglio tra la sutura del medesimo, e il braccio dell'Ichio, di modo che coll'aperta della

Testa, e del Gommaro, aprì anche il Sino che andava verso il Perineo. Ma per motivo del sangue, che usciva in gran copia, io non potei osservare se col taglio era pervenuto al fondo del Sino, onde per allora pensai a fermarlo con fila, piombacchioli, e fasciatura compressiva.

Da questa operazione fatta il dì 26. Maggio 1776. nacque una piaga con medesima suppurazione, e cessata che fu l'infiammazione, e la suppurazione, osservai col dito indice della mano sinistra, introdotto nella piaga, se col taglio era arrivato al fondo del Sino, nel quale feci una piccola apertura, nella quale v' introdussi la Testa, e col Bisturio terminai d'aprire il fondo del medesimo, senza offendere l'intestino, il quale venne d'una leggerezza bastante da potervi commodamente introdurre le fila, colle quali, e colle docimature d'acqua tiepida andai arando nelle medicature, e cessata che fu l'infiammazione, principai a portare nel fondo di quell'ampia e profonda piaga il Precipitato, coll' ajuto di piccoli piombacchioli di fila bagnati, e ruffati nel medesimo, e qualche volta toccava la piaga esterna, e intorna colla Pietra Infusibile, per confermare la carne caduta. Con questi medicamenti continuai la cura della piaga, ed ebbimo la consolazione nel termine di due mesi di vedere abbeffo, e chiuso affatto tutto il fondo della medesima, onde dissi al malato che presto sarebbe guarito, mentre non ci rimaneva altro da esserci che la piaga esterna, che anche questa era molto ristretta, particolarmente dalla parte della tuberosità dell' Istmo,

e non vi fu nemmeno da dubitare, che l'acconciata piaga molto ampia, e profonda non si fosse del tutto abolita nel suo fondo, poichè non vi potei più introdurre le fila, e neppure lo Specillo: Cosa che feci notare a tutti, ed è d'ill. tutto il vero della piaga assolutamente è chiuso. Questo fino non l'avevo certamente promesso, le di ciò non ne fossi stato più che sicuro, poichè non ho per costume, come ognun ben sa, di nascondere al male, il bene, e al male.

Or si serve pure chiunque come gli aggrada, dica pure chi vuol dire, che a me non preme. A me basta di aver fatto vedere coll'esempio, e colla ragione, e come dimostrerò, che nel caso esposto non si poteva, e non conveniva fare un taglio all'incisione, per non andare incontro alle di sopra nominata conseguenza funesta, e non potendolo recidere nell'apertura di quel gran foro fistoloso, e però altra miglior maniera di operare non poteva più adattatamente convenire, che quella che ho descritta, per ottenere il totale abolimento, come l'ottennero; e mentre stavano ad aspettare che si cicatrizzasse anche la piaga esterna circondata alla metà del Perineo molto ristretta, vidi uscire in una delle medicature dall'interno della piaga una goccia, o due di sangue. Io presi allora lo Specillo, col quale andai a quella volta, e trovai un altro seno, che un poco obliquamente andava verso il collo della vulva, alla profondità di due dita, e quasi altrettanto lontano dall'Ano, che non aveva niente che fare coll'altro seno occenato, e di già abolito, mentre la prima

Fistola era aperta verso l'orlo dell' Ano , facen-
dolo sopra l' intestino verso alla profondità di un
poco più di quattro dita , e il secondo suo fisto-
loso era distante dal medesimo circa due dita , e
due ne aveva di profondità. Questo fatto lo feci
notare a tutti , per far vedere la differenza che pas-
sava dall' uno a l' altra Fistola. Scoperto dunque
questo secondo suo , che si dirigeva più verso il
collo della vescica , che dell' Intestino , dissi al ma-
lato che bisognava aprir l' Ano con un taglio nell'
apertura di questo piccolo suo , e ciò si poteva
fare sicuramente, senza alcun pericolo , perchè il
taglio all' Intestino veniva ad esser di qua da i li-
miti del muscolo Contrittore dell' estremità del me-
desimo , e però non poteva succedere l' estremità
involontaria delle fecce , nè perdita di sangue , e
neppure si veniva a riaprire col taglio la prima
Fistola , mentre questa seconda era in un altro suo ,
e andava per un' altra direzione .

La proposizione del taglio di questo secondo
suo non mi fa accordare del malato , onde io non
gli ne discorsi più altrimenti , poichè anch' io per
uso di forzare i malati , nè di proporsi più volte
un' operazione , ma mi lusingai che questo suo po-
co profondo potesse chiudersi col Precipitato , e
colla Pietra Infernale . In tutto questo tempo le
cose passarono talmente bene , che io mi lusingava
fortemente di avere ad ottenere il mio fine . Le
mie lusinghe svanirono , poichè il Precipitato vol-
le , e la Pietra Infernale non furono medicamenti
capaci a distruggere la curva cattiva , e la callosi-
tà , e in conseguenza per l' abatemento dell' an-

curato fino; onde perduta avendo io le speranze di potersi abolire, lo esaminai di nuovo, e trovai che conservava l'istessa profondità di due dita. Laonde per la seconda volta gli proposi il taglio, mentre vedeva che difficilmente si sarebbe abolito senza il medesimo. Detto il mio sentimento, io parlavo alla natura del male, e a quel che andava fatto, me ne andai. Quasi ora dopo che sia partito il malato mi mando a chiamar di nuovo, e mi disse che voleva sentir il parere di un altro Professore. Questo essendo venuto lo informai della natura del male presente, e dissi che non vi rimaneva da fare altro, che quello che avevo proposto, e non eleggè. L'accennato Professore risentendo il male convenne meco per l'operazione. Questa, volle il malato, che fosse eseguita dal medesimo, ed io feci che questo mi liberassi dalla cura, che per tre mesi io la feci con del profino grande, relativamente al stiradimento totale di quel primo fuso, che, come si disse, si partiva dall'Ano, e si estendeva sopra l'Ischiaccio, alla dimensione di un poco più di quattro dita trasverse.

Questo è lo stato in cui era il malato quando lo lasciai, che assolutamente non aveva alcun motivo di lamentarsi di me, il rispetto alla maniera colla quale io lo aveva parlato avanti di principiare a curarlo, si ancora in ordine al modo che tenei nel principare, e nel proseguire la Cura di quel gran vizio fistoloso, che per la Dio grazia si abolì perfettamente; e si ancora perchè in tempo opportuno li proposi di aprir con un taglio il

secondo fine, dal quale non guarì, è vano, perchè mi tolse la libertà di operare.

Trasfuso questa breve digressione, e ripigliando adesso l'interrone discorso di quella Fistola, che penetrava molto in alto, e profondamente, non era quella del suddetto inferno, delle quali se ripeterò un esempio, per far vedere che non si deve recidere l'Intestino a quella profondità nell'apertura della medesima. Un giovine di circa 24 anni, Figlio di una rispettabile Famiglia di Livorno, si ammalò di febbre sinomatrica d'un' infiammazione, che gli attaccò la vescica, e il collo della medesima. Dalla infiammazione della vescica, e del suo collo nacque l'isturia. Per questo male fu necessaria l'introduzione della Siringa per estrarne l'urina. Al collo della vescica vi nacque per l'attenuata infiammazione un ostacolo così forte, per motivo del quale non fu più possibile di far penetrare la Siringa nella vescica; onde in caso si disperato, essendo la vescica molto tesa, e piena, ed avendo provati tutti gli altri mezzi inutili, mi convenne aprire la strada all'urina, perforando la vescica per la parte dell'Intestino retto: con questa operazione messi in sicuro la vita del suddetto Giovine. L'infiammazione prodotta dalla perfetta isturia si estese anche a quella pinguetudine che circonda l'Intestino retto, ove si formò un ascesso, che comparve all'Ano. Questo si aprì spontaneamente, e dall'apertura venivano fuori copiose marce, e in appresso si formò un fino fistoloso, che si partiva dall'Ano tra esso, e la parte interna della Natica sinistra, e si estendeva

va sopra l'Iniezione dietro al muscolo Costrittore, alla distanza di quattro dita, e mezzo traversar così che feci notare anche al Sig. Dott. Bernardino Tuccoli, che fu presente, come Medico, a tutta la Cura. Alcuni Cerulici poco esperti nella cognizione de' mali avrebbero tagliato l'Iniezione a quella profondità nell'apertura del seno: ma io non venni il modo di operare in questo caso, come vien proposto dal Sig. Foubert nel luogo citato, cioè aprir la Fistola, tirando il taglio fra l'Ano, e la tuberosità dell'ischio, e anche un poco più basso di questo, senza fare il taglio all'Iniezione, dalla recisione del quale a quella profondità sarebbero state inevitabilmente conseguente lesioni.

Dall'avermi io concesso nella maniera accennata per l'apertura del seno nel suddetto Giovane se fui molto contento, e soddisfatto simile il malato, e tutta la sua Famiglia, perchè il medesimo guel anche di questo gran male. Leon- de ricordandosi io di questo caso, usai l'istesso modo di operare per la Fistola del suddetto infermo, che ha fatto il Soggetto della prima storia, della quale egli pure perfettamente guarì senza recider l'Iniezione; come c' insegna l'istesso Sig. Foubert nel luogo citato, ripetersi come tre otto osservazioni. Questi essendo due di quei casi particolari, rispetto ai quali, o bisognava operare nella maniera deforma, o altrimenti bisognava medicar il male palliativamente con gli anestetici, e balsamici, perchè non si poteva, e non conveniva recider l'Iniezione a quell'altezza, per

non sottoporre questi due animali a una forte prova di pericolo, come fuol succedere, quando questa operazione si faccia ad una insinuata stitichezza, cioè può accadere, disse, l'emoergia capace di produrre la morte; come tante volte è successa alle mani di quelli, che troppo arditi si sono impegnati a recider l'intestino nell'apertura di alcune fistole, che si estendevano molto in alto, e profondamente.

Per sapere i mali grandi che soffrono attorno l'Aso, e la maniera di curarli radicalmente, ne riporserò un altro esempio assai più grave degli altri due accennati, e che conclude molto per la mia proposizione, ch'è di non doverli fare il taglio all'intestino, quando questo sia tirato deducendo, e scoperto alla direzione di quattro o cinque dita in occasione di qualche grave alcesso nato per la suppurazione di quella piagucina che lo circonda, e l'avvolge. Venghiamo alla dimostrazione.

Il molto Rever. Padre Reginaldo Estacchi all'età sua di circa 60. anni potendo parlare francese; nel Mese di Luglio del 1776. principò a sentirsi dolore la parte interna della Natica destra accanto all'Aso. Il dolore che sentiva era molto profondo, e la dava gran fastidio nel tossire, e nel sedersi il caso. L'accennato Padre che ha per me molta bontà, li consigliò meco sopra del suo male, e degl' incomodi che soffriva in quelle parti. Io lo consigliai a farsi delle fomentate calde della parte, o sporse insuppate nella Falsa. Ei seguì quello consiglio, ma il dolore della Nati-

ca andò sempre crescendo, e finalmente comparve nella medesima un' poca di dartsma, la quale in breve tempo s' infiammò. Io vedendo che si formava l'ascesso, per i segni decisivi che vi erano, di dolore, di pusure, e di tensione grande della parte ammalata, e però lo consigliai ad applicarci un empastro di pane, e latte, o qualche altra cosa umida.

Nato che fu l'ascesso accanto all' Ano lo aprii con ampio taglio il dì 26. d' Agosto del 1776. Dopo fatta l'apertura dell' ascesso, e cavate le materie, che tutti il voto occuparo dalle medesime, e trovai che quelle avevano la loro sede nel muscolo Costruttore; onde con un secondo taglio aprii anche l' Ano con due terzi dell' accennato muscolo, e ciò feci perchè il male non si gettasse ad una Fissola, come molte volte è successo per non aver spento l' Ano dopo l' apertura dell' ascesso.

Per allora medicali la piaga colle sia siccume, e la seguita continui a medicarla con le medesime, e con abbondanti lavande d'acqua tiepida. In una delle medicature vidi scendere dalla matca della parte dell' osso Sacro, quindi con lo Specillo esaminai il luogo di dove scendeva, e trovai un voto che si partiva dall' Ano, e si estendeva cutaneamente da cinque dita verso l' osso Ischiaco.

L' accennato voto lo aprii alla profondità del Sig. Dott. Luca Manzoni. L' apertura del medesimo mi diede luogo alla scoperta di un altro sinus molto profondo, che scorreva sopra l' Ischiaco, e

andava a finire tra l'osso Sacro, e il braccio posteriore dell'Ischio. V' introdotti la Tetta, e col Gamante feci scorrere per la sua scannadura lo apri, quindi il medesimo Incollino rimase scoperto alla dimensione di quattro dita, senza essere perforato.

La seguita scoppiò tre altri voti fistolosi, cioè uno dall'Ano andava al Perineo; l'altro dall'Ano verso la Natica sinistra; e il terzo scorreva attorno intorno l'elementità dell'Incollino tutto; onde col'ajuto della Tetta, e del Gamante gli apri con tagli molto lunghi, larghi, e profondi. Le lavande d'acqua tiepida, e la fila asciutta furono i medicamenti con i quali continui la cura di quella gran piaga, la quale essendo prodotta dall'apertura di sei voti fistolosi, ognuno può immaginarsi quanto fosse ampia, e profonda.

L'Incollino tutto scoperto per la dimensione di quattro dita per la parte dell'osso Sacro si ricoperse nel riproducimento della nuova carne, senza averlo reciso, come qualche Chirurgo poco esperto nella cognizione de' mali avrebbe fatto; e finalmente tutta la piaga si chiuse con le sole fila asciutte.

L'accecato Padre è guarito perfettamente, ed è sano, e contento della mia assistenza, ed ha ben ragione di esserlo, poichè egli è guarito d'un male, ch'è stato assai maggiore di quello del suddetto ammalato, e se ha ottenuto il recuperamento della salute perduta, ciò è dependuto perchè mi diede tutta la libertà di operare, relativamente al bisogno che vi era d'aprire con i voti fistolosi dell'Ano.

L'operazione dunque della Fistola dell' Ano non conviene assolutamente, & non quando il dito, e lo strumento può giungere alla parte superiore, e più profonda della Fistola, e fino, altrimenti si deve medicare palliativamente, come dice l' Editore nel luogo citato. Ora non pretendendo lo arrivare col dito, e con lo strumento alla parte superiore, e più profonda della Fistola che resta tre suddetti annuati per recider l' Intestino, come si deve sempre fare, allorchando la Fistola è poco profonda, cioè ch' è dentro il Bacio del muscolo Sfinctere dell' Ano, e però presi il compenso di aprire tutta l'elasticità del vano fistoloso in qualunque modo, con un taglio tirato secondo la diversa direzione del dito, e secondo quella parte che mi riesce più comoda per spezzarlo, senza fare il taglio all' Intestino, che assolutamente in questi casi non si deve fare, come dice Guido da Castiglione „ Se la Fistola s' ei-
 „ stende sopra il corpo dell' Intestino alla dimen-
 „ sione di quattro dita traversi, non si deve co-
 „ siderare il medesimo a quella profondità nell'
 „ apertura del ano „ per la ragione spiegata, e come si avverte parimente l' illustre Sig. Foubert nel luogo citato, e tutti i tre suddetti annuati guarirono perfettamente, e se il malato che ha fatto il Soggetto della prima Scoria non guarì dell' ultima Fistola, che le scoppiò due mesi dopo che fu abolita la prima, ciò accadde, mentre si nel colto, il diti, ed il ridico la libertà di operare.

La forma è certo in tanto, che nella cura del suddetto Inferno, che ha fatto il Soggetto,

sarno a sidet, della prima Storia, operai bene, e secondo le regole, e Caserol più accertati della Chirurgia; e operai non già a capriccio, ma con l'osservazione, coll'esperienza, e colla riflessione, e di più con tutta la diligenza possibile, come fanno tutt'i buoni, che lo soglio fare; e però nacque felicemente la guarigione della Fistola più profonda, dopo la sua apertura.

Orde chi è quello adello che voglia riconvertirmi, e fare il saputo di criticare una Cura, che sicuramente è stata ben regolata; ma chi fa che non vi sia stato qualcheuno che per compiacere alla Gente, più che di rendermi giustizia, non abbia criticato il mio operato. Ma io posso dire asseveratamente, che il malato quasi della Fistola più alta, e profonda, dopo di averla convertita in piaga aperta per un corso d'infiammazione, e suppurazione.

Che poi l'istesso ammalato, dal quale mi illustrai, si sia prevalso d'un altro Cerevico per farsi curare dell'istessa Fistola, ciò non oscurò la chiara luce di quella sacra verità, con la quale alla meglio che ho potuto mi sono impegnato, amico Lettore, di metterli sotto degli occhi il fatto giusto, e sincero. Del resto io ti confidisco Giudice, ma dispassionato; eliminarmi le mie riflessioni, e ponendo all' esame del tuo criterio le mie ragioni, giudicherai secondo i dettami, non del tuo genio, ma dell'equità, e delle più sante Leggi della Chirurgia.

Nel tempo che si stampava questa mia Dissertazione, feci l'operazione del taglio guastamente indicata per l'apertura di una Fistola, che aveva nell' Ano Giovanni Malinchi di Livorno. Questa Fistola s' estendeva sopra l' intestino retto, alla distanza di due dita trasverse, senza che il medesimo intestino fosse aperto, onde la Fistola era della specie di quelle che chiamansi cieche. L' operazione la feci il dì 4. Gennaio 1777. Nel convertire questa Fistola in piaga aperta tagliai l' Ano, con due terzi del malcosto Costrittore del medesimo, e nel tempo stesso apersi con l' aiuto della Tetta, e del Bisturio due altre piccole Fistole scorrenti per la Natica sinistra, sicchè quando le Fistole sono poco profonde, si deve tagliar l' Ano, ma quando penetrano molto in alto, e profondamente, non si deve tagliare l' intestino retto a quella profondità nell' apertura della medesima, come ho fatto vedere di sopra. Il malato non ha sofferto fin qui il minimo pericoloso accidente, e va avanzandosi verso di una perfetta guarigione.

I L F I N E.

663